

FERROCAL

500

Ferroterápico vitaminado

Vía de administración: Oral

Fórmula: Cada comprimido recubierto contiene:

Hierro elemental (como Sulfato Ferroso) 150 mg, Ácido Fólico 1 mg, Vit.B1 6 mg, Vit.B2 6 mg, Vit.B6 5 mg, Vit.B12 25 mcg, Nicotinamida 30 mg, Pantotenato de Calcio 10 mg, Vit.C 250 mg, Excipientes: Alcohol Etilico 0,14 mL; Lactosa Monohidrato 156,82 mg; Color Amarillo FDC N° 6 Lake 5,50 mg; Otros Excipientes c.s.

Indicaciones: Anemias uni o pluricaenciales, parásitonutricionales, del embarazo, de la adolescencia o vejez, post- quirúrgicas.

Posología: 1 comprimido recubierto por día preferentemente en ayunas.

Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad a algunas de las vitaminas del complejo B presentes en la formulación o al Hierro. Pacientes con carcinoma gástrico, colitis ulcerosa o úlcera gastroduodenal. Pacientes con antecedentes de formación de cálculos o de gota. No debe administrarse en la enfermedad de Leber pues ha producido atrofia del nervio óptico.

Reacciones adversas: Efectos Colaterales: Nauseas, vómitos, malestar gástrico superior y diarrea. Podrían presentarse además dolor abdominal y constipación.

Precauciones y advertencias: Debe tenerse especial cuidado en la administración en aquellos pacientes que puedan desarrollar una sobrecarga de Hierro, así como en los que presenten hemocromatosis, anemia hemofílica o aplasia eritrocitaria. No deberá usarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. Pacientes Hemofílicos ya que el Pantotenato de Calcio prolonga el tiempo de sangría.

Sobredosis: Diarreas con sangre, Náuseas intensas, Fuertes vómitos que a veces contienen sangre, Calambres y dolores agudos en el estómago.

Interacciones:

- Evitar administración intravenosa de sales de hierro concomitantemente con sales de hierro por vía oral: puede inducir hipotensión o incluso colapso debido a la rápida liberación de hierro por saturación de la transferrina.
- Evitar doxiciclina: las sales de hierro administradas por vía oral inhiben la absorción y la circulación enterohepática de doxiciclina.
- Prolongar todo lo posible el intervalo de administración entre los preparados de hierro y los siguientes agentes terapéuticos, por posibilidad de inhibir su absorción: fluoroquinolonas, metildopa (forma L), hormonas tiroideas, tetraciclinas, penicilamina, bifosfonatos, levodopa, agentes antiinflamatorios no esteroideos, antiácidos y calcio.

Conservación: Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

Presentación: Frasco conteniendo 20 comprimidos recubiertos

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".

MEDICAL

Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón Reg. N°: 535

Fabricado por: **INDUFAR CISA**
Planta Industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13