

GARTEM HEMORROIDAL

PLUS

Hidrocortisona - Lidocaína - Óxido de Zinc

Anestésico - Antihemorroidal - Antiinflamatorio

Crema

Vía de Administración: Tópica Rectal

FÓRMULA

Cada 100 gramos contiene:

Hidrocortisona (como acetato 167 mg).....	150 mg
Lidocaína HCl.....	1000 mg
Óxido de Zinc.....	4000 mg
Excipientes.....	c.s.p.

INDICACIONES

Hemorroides internas y externas. Prurito anal, anusitis, criptitis, papilitis, trombosis hemorroidal aguda; fisura anal. Tratamiento pre y postoperatorio de hemorroidectomía; eccema anal. Además se indica para dolores específicos derivados de tejidos anorrectales irritados.

POSOLOGÍA

Aplicar la crema una cierta cantidad en el conducto rectal, 2 a 3 veces al día y después de cada deposición, como terapia inicial. Para condiciones que requieren una aplicación profunda como hemorroides internas, usar la cánula rectal que se provee. Para la terapia de mantenimiento se puede reducir la dosificación a 1 – 2 aplicaciones diarias o solo después de cada deposición o salvo criterio médico.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formula, hemorragia hemorroidal.

Los corticosteroides tópicos no deberán emplearse en casos de lesiones tuberculosas de la piel, dermatosis sifilíticas, infecciones virales cutáneas, incluso herpes simples y varicela o en las reacciones posvacunales.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones alérgicas (en los casos más severos choque anafiláctico) a los anestésicos locales de tipo amida. Se han reportado las siguientes reacciones locales después del tratamiento con corticoesteroides: atrofia de la piel frecuentemente reversible, telangiectasia, púrpura y estrías, dermatitis de tipo rosáceo y perioral con o sin atrofia dérmica, efecto de rebote que puede causar dependencia de los esteroides, retardo en el proceso de cicatrización. La cara, piel vellosa o la piel en genitales son más sensibles a efectos locales. El uso inapropiado puede enmascarar o agravar infecciones bacterianas, parasitarias, micóticas o virales El riesgo de efectos secundarios locales se incrementa al aumentar la dosis del producto y la duración del tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No debe usarse por periodos prolongados en pacientes con insuficiencia renal. Evitar tratamientos de larga duración.

Embarazo: No debe usarse durante el embarazo a menos que el beneficio potencial justifique el riesgo potencial para el feto.

Lactancia: Lidocaína e Hidrocortisona se excretan en la leche materna en pequeñas cantidades sin presentarse ningún efecto sobre el niño a dosis terapéuticas.

Uso exclusivamente para aplicación anal.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No se observaron efectos sobre la capacidad para conducir y operar máquinas.

INTERACCIONES

Se puede dar el riesgo de toxicidad sistémica agregada con grandes dosis de lidocaina en pacientes que estén recibiendo otros anestésicos locales o agentes estructuralmente relacionados con ellos.

SOBREDOSIS

No se han observado casos de sobredosificación.

Ante la eventualidad de ingestión puede producir náuseas, vómitos o sequedad de boca

TRATAMIENTO

El tratamiento consiste en el vaciamiento gástrico mediante la inducción de la emesis o lavado de estómago.

CONSERVACIÓN

Mantener a temperatura ambiente (15 °C a 30 °C).

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo pomo de 20 g con cánula aplicador.

Manténgase fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta

"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Nacional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y Teodoro S. Mongelós. Teléfono: 220-418".



Regente: Quím. Farm.

Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

Fabricado por:

INDUFAR CISA

Planta Industrial y distribución;

Calle Anahí e/ Zaavedra y

Bella Vista - Fndo. de la Mora

Zona Norte - Paraguay

E-mail: indufar@indufar.com.py

P. web: www.indufar.com.py

Teléfonos: 682 510 al 13